



แม็กซ์ฟลอร์ซ

ควอนตัม

ตารางการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

วิธีการ	อัตราผสม	อัตราการใช้
ป้ายหรือหยอดเหยื่อ ในบริเวณที่มีมด ชุกชุม หรือตามทางเดินของมด หรือบริเวณ รังที่อยู่อาศัยของมด ตามรอยแตก ร้าว รู หรือ รอยแยกของห้อง ขอบประตู หน้าต่าง เพื่อ ประสิทธิภาพ ที่ดีขึ้นควรหยอดครั้งละหลายๆ จุด โดยให้ แต่ละจุดห่างกันประมาณ 1 เมตร และ ให้ป้าย หรือหยอดเหยื่อเพิ่มเติมเมื่อยัง พบเห็นมดเดินอยู่ในบริเวณนั้น	1 หยด เท่ากับ 0.2 กรัม (ขนาดประมาณเมล็ดถั่วเขียว)	1 หยด : 1 ตารางเมตร ควรหยดตามทางเดินของมด แต่อย่าให้ถูกตัวมด หรือ ตามจุดเข้า-ออกของมดตู้พื้นที่

*****โปรดอ่านฉลากให้ละเอียดก่อนใช้ทุกครั้ง*****



Bayer

หน่วยธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2232-7000 • โทรสาร 0 2235-4159
www.environmentalscience.bayer.co.th

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่



Hotline สายแมลง 0 2232 7123



Environmental Science Thailand