

## ตารางการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

วิธีการ	อัตราการผลิตผสม	อัตราการใช้
เท ราคูมิน ไรซ์เบท ลงในภาชนะรองรับ แล้วนำไป วางไว้ที่มีคซิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรเติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูกินไปแล้ว และวางติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน	ราคูมิน ไรซ์เบท 50-100 กรัม	วาง ราคูมิน ไรซ์เบท ห่างกันจุดละ 1-2 เมตร

**\*\*\*โปรดอ่านฉลากให้ละเอียดก่อนใช้ทุกครั้ง\*\*\***



## Bayer

หน่วยธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  
130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0 2232-7000 • โทรสาร 0 2235-4159  
[www.environmentalscience.bayer.co.th](http://www.environmentalscience.bayer.co.th)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่



**Hotline สายแมลง 0 2232 7123**



**Environmental Science Thailand**