



ราคูมิน®  
แวกซ์บล็อก

## ตารางการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

\*ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดหนู\*

วิธีการ	อัตราการใช้	ลักษณะการใช้ ราคูมิน เพสท์
เท ราคูมิน แวกซ์บล็อก ลงในภาชนะรองรับ แล้ววางไว้ในที่มีดชืด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ให้เดิมทดแทนที่ถูกหนูกินไปติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 6 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบร่องรอยหนู	10 – 20 กรัม (2-4 ก้อน)	วาง ราคูมิน แวกซ์บล็อก ห่างกันจุดละ 1-2 เมตร

\*\*\*โปรดอ่านฉลากให้ละเอียดก่อนใช้ทุกครั้ง\*\*\*



Bayer

หน่วยธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  
130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0 2232-7000 • โทรสาร 0 2235-4159  
[www.environmentalscience.bayer.co.th](http://www.environmentalscience.bayer.co.th)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่



Hotline สายแมลง 0 2232 7123



Environmental Science Thailand